

# Samenvatting van dexamethason

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Dexamethason is een bijnierschorshormoon (corticosteroid). Het remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- kanker
- COVID-19 (corona)
- bloedziektes
- ontstekingen van de luchtwegen, de huid en gewrichten
- ernstige allergische reacties
- hoogteziekte
- hersenvliesontsteking
- bijnierziekten

Het werkt binnen een paar uur.

## Gebruik

Dexamethason is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u mag gebruiken.

### Tabletten en capsules met dexamethason

Slik de tabletten of capsules met een half glas water.

### Drank met dexamethason

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker of maatpipet.
3. Drink die hoeveelheid op.

Dexamethason wordt vaak gebruikt als een **stootkuur**. U krijgt dan een paar dagen een hoge dosering dexamethason.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van de maag en darmen.
- hoofdpijn
- spierpijn
- veranderingen in emoties, zoals bang zijn of depressie
- vocht in uw benen of handen
- infecties

Gebruikt u vaker per jaar een stootkuur? Of gebruikt u dit medicijn langer dan een paar weken? U kunt zwaarder worden en een bol gezicht krijgen. Ook kunt u huidklachten zoals blauwe plekken en broze botten krijgen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.s.

## Waarschuwingen



**Let op!** Dexamethason en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met dexamethason.



**Let op!** Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken en wilt u stoppen? Stop dan niet in 1 keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: hoofdpijn, trillen, hartkloppingen en een misselijk gevoel. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? En gaat u dit medicijn langer dan een paar weken gebruiken? Geef dan **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Gaat u dit medicijn kort gebruiken? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.