

Samenvatting van dexamethason, chlooramfenicol en polymyxine B in het oog

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Chlooramfenicol en polymyxine B zijn antibiotica. Ze bestrijden veel soorten bacteriën. Dexamethason remt ontstekingen. Het maakt roodheid, zwelling, pijn en jeuk van het oog minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij bacteriële ooginfecties.

Gebruik

Dexamethason, chlooramfenicol en polymyxine B voor in het oog is er als oogdruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje.
5. Er valt een druppel in het 'gootje'.
6. Sluit uw oog en druk het traankanaaltje ten minste 1 minuut lang dicht.
7. Sluit het flesje meteen.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u gaat druppelen. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of **bekijk het instructiefilmpje** op deze site.



Let op! Bewaar de oogdruppels in de koelkast. Na openen zijn de oogdruppels **1 maand houdbaar**.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Geïrriteerde of branderige ogen. Dit gebeurt direct na het druppelen en verdwijnt snel.
- Bittere smaak in de mond. U heeft hier minder kans op als u de traankanaaltjes na druppelen ten minste 1 minuut dichtdrukt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken tijdens het 3e trimester van de zwangerschap. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby in uw buik. Tijdens het 1e en 2e trimester kunt u het veilig gebruiken. Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dichtdrukken. Er komt dan veel minder van dit medicijn in het bloed.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan slecht zijn voor de baby.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

