

Samenvatting van Dexamethason, framycetine en gramicidine in het oor

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Framycetine en gramicidine zijn antibiotica: ze doden bacteriën. Dexamethason remt ontstekingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties van het middenoor.

Het werkt binnen een paar dagen.

Gebruik

Dexamethason, framycetine en gramicidine is er als oordruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Maak het druppelflesje even warm in uw handen.
2. Houd uw hoofd opzij.
3. Laat de druppels in de gehoorgang van uw oor vallen.
4. Houd uw hoofd nog 3 minuten schuin of ga op uw zij liggen.

Heeft u in de ochtend geen afscheiding meer uit het oor? Gebruik het medicijn dan nog wel dezelfde dag. Stop er de volgende dag mee..

Bijwerkingen

U kunt meteen last krijgen van een prikkend of brandend gevoel in uw oor. Dit verdwijnt snel. Houdt u hier toch last van? Neem dan contact op met uw arts.

Let op! Heel soms zijn mensen overgevoelig (allergisch) voor dit medicijn. Dit merkt u aan meer jeuk en een rood en dik oor. Neem dan contact op met uw arts. Geef ook aan uw apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn.

Waarschuwingen

Let op! Gebruik de oordruppels niet langer dan 7 dagen. Anders kan uw trommelvlies kapotgaan.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

