

Samenvatting van dexamethason met framycetine en gramicidine in het oog

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Framycetine en gramicidine zijn antibiotica. Ze bestrijden veel soorten bacteriën. Dexamethason remt ontstekingen. Het maakt roodheid, zwelling, pijn en jeuk van het oog minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij bacteriële ooginfecties.

Gebruik

Dexamethason met framycetine en gramicidine voor in het oog is er als oogdruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u gaat druppelen. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

1. Was uw handen en droog ze af met een schone doek.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje.
5. Laat 1 druppel in het 'gootje' vallen.
6. Sluit uw oog zonder te knijpen.
7. Druk uw traankanaaltje 1 minuut dicht.
8. Sluit het flesje.

Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van geïrriteerde of branderige ogen. Dit gebeurt direct na het druppelen en verdwijnt snel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën over.

Gebruikt u andere medicijnen in uw oog? Wacht minstens **3 minuten** tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

