

# Samenvatting van disulfiram

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Disulfiram geeft binnen 5 tot 10 minuten nadat u alcohol drinkt vervelende klachten. Zoals benauwd zijn, misselijk voelen, hoofdpijn en hartkloppingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor als hulpmiddel bij het stoppen met alcohol drinken.

## Gebruik

Disulfiram is er als tabletten en bruistabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met disulfiram

Slik de tablet met een half glas water.

### Bruistabletten met disulfiram

1. Laat de bruistablet uit elkaar vallen in een glas water of vruchtensap.
2. Wacht tot het bruisen is gestopt en drink op.
3. Spoel het glas daarna met water en drink dat ook op.

De eerste tablet werkt na 3 tot 12 uur.

Heeft u net alcohol gedronken? Wacht dan 12 uur voordat u dit medicijn slikt.

Als u stopt met disulfiram, kunt u nog 2 weken lang vervelende klachten krijgen nadat u alcohol heeft gedronken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn en knoflooksmak.
- Verdwijnt dit niet binnen 1 tot 2 weken? Ga dan naar uw arts.
- huiduitslag
- geen stijve penis kunnen krijgen bij opwinding (impotentie)
- minder zin in vrijen
- schade aan de lever
- slaperig, moe en duizelig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** U mag de **eerste paar dagen** niet autorijden als u met dit medicijn begint. Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.



**Let op!** Drink geen alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn is bedoeld om u te helpen bij het stoppen met alcohol drinken. Als u alcohol drinkt krijgt u vervelende klachten. U kunt ook vervelende klachten krijgen als u met alcohol in contact komt, bijvoorbeeld als u het inademt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Alcohol drinken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de baby. Bij combinatie van dit medicijn met alcohol tijdens de zwangerschap bestaat een risico op aangeboren afwijkingen. Daarom kunt u beter stoppen met alcohol, zonder dit medicijn te gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken als u zwanger wilt worden.