

Samenvatting van domperidon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Domperidon laat uw maag en darmen meer bewegen. Hierdoor gaat voedsel sneller van de maag naar de darm. Bij borstvoeding zorgt domperidon ervoor dat u meer moedermelk maakt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- misselijk zijn en overgeven.
Soms ook bij misselijk zijn bij migraine.
- problemen bij borstvoeding
- bepaalde vormen van lage bloeddruk
- een maagdie te langzaam werkt

Dit medicijn werkt binnen 15 tot 30 minuten. Het werkt 6 tot 8 uur.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een droge mond. Daardoor kunt u eerder gaatjes krijgen. Poets en flos uw tanden extra goed.

Heeft u veel last van deze bijwerking? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Gebruik

Domperidon is er als tabletten, smelttabletten, drank en zetpillen. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met domperidon

Slik de tabletten met een half glas water.

Smelttabletten met domperidon

Laat de smelttablet op uw tong smelten. Slik het daarna door. U kunt de smelttablet ook in een half glas water oplossen en opdrinken.

Drank met domperidon

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbekertje of een maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.

Zetpillen met domperidon

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).
3. Duw met een vinger de zetpil helemaal naar binnen.

Wanneer gebruikt u dit medicijn?

Drank en tabletten: slik dit medicijn **15-30 minuten** voor een maaltijd. Gebruikt u dit medicijn voor **migraine**? Neem het dan bij de eerste klachten van een aanval. Neem het samen met uw pijnstiller.

Waarschuwingen

Let op! Gebruik domperidon niet langer dan **1 week**. Als u het langer gebruikt kunt een hartritmestoornis krijgen. Heeft u na 1 week nog klachten? Overleg dan met uw arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! U mag dit medicijn **kort** (1 week) gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker. Ook als u dit medicijn gebruikt om meer moedermelk te maken.