

Samenvatting van famotidine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Famotidine zorgt dat uw maag minder zuur maakt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij ontsteking van de slokdarm door brandend maagzuur
- bij maagzweren en darmzweren
- om de maag te beschermen tegen medicijnen die de maag kunnen beschadigen

U heeft binnen een paar dagen minder last van uw maag.

Gebruik

Famotidine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water. Dit kan op elk moment van de dag als u dit medicijn 1 keer per dag slikt.

- Slikt u dit medicijn 2 keer per dag? Doe dit dan in de ochtend na het ontbijt en in de avond na de avondmaaltijd of voor u gaat slapen. Op deze momenten is de aanmaak van maagzuur het grootst.
- Heeft u vooral **in de nacht klachten**? Slik dit medicijn dan na het avondeten of voor u gaat slapen.
- Heeft u vooral **tijdens het eten klachten**? Slik dit medicijn dan 1 uur voor het eten.

Hoelang u dit medicijn moet gebruiken, hangt af van uw klacht. Soms moet u het maanden tot jaren gebruiken, om te voorkomen dat uw klachten terugkomen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- maag en darmklachten. Zoals misselijk voelen, buikpijn, diarree of verstopping.
- hoofdpijn
- duizelig voelen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Famotidine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met famotidine.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

