

Samenvatting van finasteride

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Finasteride zorgt dat het mannelijk hormoon testosteron minder invloed heeft op de prostaat en op de haarzakjes in de huid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- plasproblemen door een vergrote prostaat.
U merkt na 2 tot 6 maanden of het goed genoeg werkt.
Heeft u na 6 maanden nog steeds plasproblemen? Overleg dan met uw arts.
- kaalheid bij mannen.
U merkt na 3 tot 6 maanden dat er een beetje haar groeit op plekken die eerder kaal waren. Als u stopt met finasteride verdwijnen de nieuwe haren weer, binnen een half tot 1 jaar.
- te veel haargroei bij vrouwen.
Na een paar maanden groeien de haren minder.

Gebruik

Finasteride is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.
U gebruikt dit medicijn meestal 1 keer per dag.

Bijwerkingen

Mannen kunnen last krijgen van seksuele problemen, zoals:

- geen stijve penis kunnen krijgen
- minder zin hebben in seks

U kunt hier last van blijven houden, ook als u stopt met het gebruik van dit medicijn.

Bijwerkingen bij vrouwen zijn niet bekend.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn verstoort de normale groei van de baby in uw buik. U mag finasteride ook **niet per ongeluk aanraken**. Bijvoorbeeld als iemand een tablet doormidden breekt of fijnmaakt.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

