

Samenvatting van **Flecaïnide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Flecaïnide maakt uw hartslag langzamer en zorgt dat uw hart regelmatig klopt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren
- om hartritmestoornissen te voorkomen

Binnen een paar uren worden uw hartkloppingen minder.

Gebruik

Flecaïnide is er als tabletten, capsules en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en capsules.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met flecaïnide

Slik de tablet met een half glas water.

Capsules met flecaïnide

- Slik de capsule heel door. **Kauw niet** op de capsule.
- Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook openen en de korrels doorslikken met een half glas water. **Kauw niet** op de korrels.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- licht gevoel in het hoofd of duizelig zijn
- wazig of dubbel zien

Meestal verdwijnen deze klachten binnen een aantal weken. Blijft u hiervan last houden? Overleg dan met uw arts.

Soms wordt een hartritmestoornis erger. Uw arts controleert u hierop. Merkt u dat uw hartklachten erger worden? Waarschuw dan uw arts

Waarschuwingen



Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u flecaïnide veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u flecaïnide mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Gebruik flecaïnide in ieder geval NIET tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

