

Samenvatting van fluconazol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Fluconazol doodt schimmels en gisten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij schimmelinfecties.
Zoals van de vagina, penis, mond, keel, huid (zoals voetschimmel) en nagels.
- om schimmelinfecties te voorkomen.

Gebruik

Fluconazol is er als capsules en drank.

Dit medicijn is er ook als infuus. Deze tekst gaat alleen over de capsules en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Capsules met fluconazol

Slik de capsule met een half glas water.

Let op! U mag niet kauwen op de capsule.

Heeft u moeite met slikken? Dan mag u de capsule openmaken en het poeder slikken met een lepel yoghurt, appelmoes of vla.

Drank met fluconazol

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of spuit.
3. Drink die hoeveelheid op.

Een kuur kan een paar dagen tot een paar maanden duren.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van maag en darmen.
Zoals misselijk zijn, buikpijn en diarree.
- hoofdpijn
- slaperig zijn, duizelig zijn en wazig zien

De klachten gaan meestal vanzelf over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of gaan ze niet over? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! U kunt ook last krijgen van **huiduitslag**.

Stop dan met dit medicijn en bel **meteen** uw arts.

Misschien bent u **allergisch** voor dit medicijn. Bent u allergisch voor fluconazol? Meld dit dan bij uw apotheek.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog schimmels.



Let op! Fluconazol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met fluconazol.



Let op! Bent u slaperig of duizelig of ziet u wazig? Dan mag u niet autorijden.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Lang gebruik kan van dit medicijn kan slecht zijn voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Overleg met uw arts of apotheker.