

# Samenvatting van gliclazide

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Gliclazide maakt uw bloedsuiker lager.  
Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed.  
Dit is slecht voor uw hart en bloedvaten, zenuwen, ogen en nieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Dit medicijn zorgt ervoor dat u meestal binnen een paar dagen minder last heeft van klachten. Zoals dorst, vaak plassen en een droge mond.  
Binnen een paar weken bent u minder moe.

## Gebruik

Gliclazide is er als tabletten met een vertraagde afgifte.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken..

Neem de tablet met vertraagde afgifte kort voor of tijdens het eten in.

**Let op!** Slik de tabletten met verlengde afgifte **héél door**

Hier komt de werkzame stof langzaam uit vrij.  
U mag deze tabletten **niet fijnmaken of erop kauwen**. Anders komt dit medicijn in één keer vrij.  
Dan kunt u last krijgen van bijwerkingen.

Heeft de tablet een breukstreep? Dan mag u de tablet op de breukstreep doormidden breken. Slik de beide helften héél door met een beetje water.

## Bijwerkingen

De belangrijkste bijwerking van gliclazide is een **hypo**. Bij een hypo heeft u te weinig suiker in uw bloed.

U merkt dat aan:

- honger
- bleke huid
- trillen
- zweten
- duizelig voelen
- hoofdpijn
- moe voelen
- lauwvallen

De klachten bij een hypo zijn bij iedereen anders. Misschien heeft u niet al deze klachten als u een hypo heeft.

## Wat moet u doen bij een hypo?

Eet of drink snel iets met suiker. Eet daarna een boterham.

Verder kunt u last krijgen van:

- zwaarder worden
- wazig zien in het begin van de behandeling.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

**Let op!** Door een hypo kunt u een ongeluk krijgen.

### Wat moet u doen als u wilt autorijden?

- Rijd alleen als u zich goed voelt.
- Meet voor het rijden uw bloedsuiker.
- Rijd alleen als u weet dat u een hypo kunt voelen aankomen.
- Overleg met uw arts of u veilig kunt autorijden.



**Let op!** Door alcohol kunt u een hypo krijgen. En uw lichaam voelt minder snel een hypo aankomen. Drink dus niet. Of drink minder dan 2 glazen alcohol per dag.

# Samenvatting van **gliclazide**



**Let op! Niet gebruiken** als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op! Geef geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

