

Samenvatting van **latanoprost oogdruppels**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Latanoprost zorgt voor een betere afvoer van water uit de oogbol. Hierdoor neemt de druk in het oog af.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk). Door glaucoom kunnen netvlies en oogzenuw beschadigen.

De oogboldruk wordt binnen 4 weken minder.

Gebruik

Latanoprost in het oog is er als oogdruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Gebruik de oogdruppels bij voorkeur 's avonds, omdat het dan sterker werkt.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u gaat druppelen. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

1. Was uw handen en droog ze af met een schone doek.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje.
5. Laat 1 druppel in het 'gootje' vallen.
6. Sluit uw oog zonder te knijpen.
7. Druk het traankanaaltje 1 minuut dicht.
8. Sluit het flesje.

Gebruikt u ook andere oogdruppels? Wacht minstens 5 minuten tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels.

Gebruikt u zowel oogdruppels als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en **5 minuten** later de oogzalf of ooggel.

Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van rode ogen. Gaat dit niet weg of gaan uw ogen jeuken? Raadpleeg dan uw arts.

Een lichte irritatie na het druppelen is normaal. Dit verdwijnt meestal vanzelf.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

