

# Samenvatting van metamizol

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metamizol zorgt voor minder pijn, spierkrampen en ontstekingen en het verlaagt koorts.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij koorts en hevige pijn, zoals pijn na een operatie, pijnaanval door niersteen (niersteenkolië) en pijn bij kanker en bij migraine.

De pijn wordt minder binnen 30 minuten. Dit medicijn werkt ongeveer 4 uur tegen pijn.

De koorts wordt binnen 30 minuten tot 1 uur minder. Het blijft 4 tot 6 uur werken tegen koorts.

## Gebruik

Metamizol is er als tabletten en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met metamizol

- Slik de tablet heel door met een half glas water.
- Let op! Neem dit medicijn niet meer dan 4 keer op een dag. Zorg dat er tussen iedere inname minimaal 6 uur zit.

### Injecties met metamizol

U krijgt de injecties in het ziekenhuis van de arts of verpleegkundige.

**Let op!** Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 weken achter elkaar.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Een rode kleur van uw plas. Dit is onschuldig.
- Bloedingen. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige poep. Stop dan met dit medicijn en waarschuw meteen uw arts.
- Bij de injecties: huiduitslag, pijn en reacties op de injectieplaats.

**Let op!** U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** een maagzweer of darmzweer gehad?

Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te beschermen (maagbeschermer). Vraag dit aan uw arts of apotheker.

## Waarschuwingen



**Let op!** Metamizol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met metamizol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor uw baby. U mag metamizol in ieder geval NIET gebruiken in de tweede helft van de zwangerschap (vanaf 20 weken).



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.