

Samenvatting van methylprednisolon

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Methylprednisolon is een bijnierschorshormoon (corticosteroid). Het remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- Multiple Sclerose (MS)
- Lupus Erythematoses (LE)
- reumatische ziektes
- ontstekingen van de darmen, huid, luchtwegen en ogen
- bloedziekten
- ernstige allergische reacties
- nierziekten
- kanker
- misselijk gevoel door chemotherapie
- bij bijnierziekten, om het eigen cortisol aan te vullen

Binnen een paar uur worden uw klachten minder.

Gebruik

Methylprednisolon is er als tabletten, capsules, infuus en injecties. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten of capsules met methylprednisolon

Slik de tabletten of capsules met een half glas water. Doe dit tijdens of vlak na het eten.

Injectie of infuus met methylprednisolon

U krijgt de injectie of het infuus van uw arts of verpleegkundige.

Methylprednisolon wordt ook gebruikt als **stootkuur**. Dit is een kuur die een paar dagen tot weken duurt. Hiervan merkt u binnen een paar uur dat het werkt

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt in het begin last krijgen van:

- maagklachten
- hoofdpijn
- spierpijn

Gebruikt u dit medicijn langer dan een paar weken? Of gebruikt u dit medicijn vaker in een jaar als stootkuur?

Dan kunt u last krijgen van:

- zwaarder worden
- een bol gezicht
- huidklachten, als blauwe plekken
- botontkalking (broze botten)

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Methylprednisolon en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar.

Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met methylprednisolon.



Let op! Gebruikt u dit medicijn langer dan 3 weken en wilt u stoppen? Stop dan niet in één keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: hoofdpijn, trillen, hartkloppingen en misselijk gevoel. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken. Soms moet u na de injectie met methylprednisolon 2 tot 4 uur wachten voor u weer borstvoeding mag geven.