

Samenvatting van nitroglycerine pleister

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nitroglycerine maakt uw bloedvaten wijder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- Bij hartkramp (angina pectoris)
- Om een aderontsteking (tromboflebitis) te voorkomen als u een infuus krijgt dat minimaal 2 dagen duurt.

Gebruik

Nitroglycerine is er als pleister.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Scheur het zakje met de pleister open. Haal de pleister uit het zakje.
2. Haal de beschermende folie eraf.
3. Probeer het plakkende deel niet met uw vingers aan te raken.
4. Plak de pleister op een schone en droge plaats op de linker of rechterkant van uw borstkas of aan de binnenkant van uw bovenarm.
5. Druk de pleister goed aan.

Let op! Plak de pleister elke dag op een andere plaats. Anders kan de pleister uw huid irriteren. Gebruikt u de pleister overdag bij angina pectoris? Verwijder de pleister voordat u gaat slapen. Als dit medicijn de hele dag in uw bloed zit, dan kan het effect minder worden.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn, soms bent u hierbij misselijk. Dit wordt na een paar dagen minder.
- duizelig zijn
- rode huid, irritatie en jeuk op de plaats van de pleister.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

