

Samenvatting van oxybutynine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxybutynine ontspant de spieren van uw blaas. Hierdoor past er meer urine (plas) in uw blaas. U hoeft dan minder vaak te plassen. Ook kan het zorgen dat u minder gaat zweten en dat uw mond minder speeksel aanmaakt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- urine-incontinentie. Bijvoorbeeld als u vaak aandrang heeft en steeds maar weinig plast. Of bij bedplassen.
- soms als u te veel zweet
- soms als uw mond te veel speeksel aanmaakt
- soms bij opvliegers als u hormoontherapie bij borstkanker krijgt

Merkt u na 4 weken onvoldoende verbetering? Raadpleeg dan uw arts.

Gebruik

Oxybutynine is er als tabletten, stroop en blaasspoeling. Dit medicijn is er ook als pleisters. Deze tekst gaat alleen over de tabletten, stroop en blaasspoeling.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met oxybutynine

Slik de tabletten met een half glas water.

Stroop met oxybutynine

Meet de goede hoeveelheid af met een doseerspuit. Spuit daarna de stroop in uw mond.

Blaasspoeling met oxybutynine

1. Uw arts legt uit hoe u de vloeistof het beste in de blaas kan inbrengen.
2. Probeer na het inbrengen van het medicijn zo lang mogelijk uw plas op te houden. Hierdoor krijgt dit medicijn genoeg tijd om goed te kunnen werken op de blaaspier.

Gebruikt u een plastic slangetje (katheter) om de plas uit de blaas te laten lopen? Dan blijft het medicijn in de blaas totdat u uw blaas weer leegt met het plastic slangetje.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig voelen
- slaperig en moe zijn
- wazig zien
- misselijk zijn. U heeft hier minder last van als u dit medicijn met wat voedsel neemt.
- buikpijn en verstopping. Bij verstopping helpt het om voeding met veel vezels te eten en veel vocht te drinken.
- een droge mond of huid

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! U mag **de eerste paar dagen niet autorijden** als u met dit medicijn begint.

Daarna mag u weer autorijden als u geen last heeft van bijwerkingen.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

