

Samenvatting van oxytocine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxytocine is een hormoon. Het zorgt dat de melkklieren in de borst samentrekken.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- Om te zorgen dat er meer melk uit de borst vrijkomt bij problemen met borstvoeding.

Dit medicijn werkt na 2 tot 5 minuten. Het blijft een half uur tot 1 uur werken.

Gebruik

Oxytocine is er als neusspray. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus of injectie. Deze tekst gaat alleen over de neusspray.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Gebruikt u de neusspray voor de eerste keer? Spray dan een aantal keer in de lucht. Dan is de neusspray klaar voor gebruik.
2. Zit rechtop als u dit medicijn gaat gebruiken.
3. **Spray 1 keer in 1 neusgat.** Adem daarbij zachtjes door de neus in. **Doe dit ongeveer 5 minuten voordat u borstvoeding wilt geven of wilt afkolven.**

Let op! Het flesje is na openen **1 maand houdbaar**. Bewaar de neusspray na openen op **kamertemperatuur**.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- ijnlijke kramp in de onderbuik. Dit gebeurt meteen nadat u oxytocine heeft gebruikt. Het komt doordat de spieren van de baarmoeder samentrekken. Dit trekt vanzelf weer weg.
- misselijk zijn
- hoofdpijn
- hartkloppingen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent en nog niet moet bevallen. Dit medicijn kan ervoor zorgen dat u te vroeg bevalt.



Dit medicijn wordt gebruikt bij problemen met de borstvoeding. Daarom mag u dit medicijn gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

