

Samenvatting van paracetamol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paracetamol is een pijnstiller. Het verlaagt ook koorts.

Paracetamol werkt bij verschillende soorten pijn, zoals:

- hoofdpijn, migraine
- keelpijn, oorpijn, kiespijn, zenuwpijn
- rugpijn, spierpijn of gewrichtspijn
- menstratieklachten
- artrose, u heeft dan pijn doordat het kraakbeen in uw gewricht dunner wordt

Het werkt verder ook bij pijn en koorts, door griep en verkoudheid.

Gebruik

Paracetamol is er als, capsules, verschillende soorten tabletten, drank, korrels (granulaat), poeder en zetpillen. Dit medicijn is er ook als infuus. Deze worden door uw arts of verpleegkundige gegeven.

In de bijsluiter staat **hoe en hoeveel** u moet gebruiken. **Let op!** Gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat. Dit is niet goed voor uw lever.

Gebruik paracetamol alleen als u pijn heeft. Stop als de pijn is verdwenen.

Heeft u na een paar dagen nog steeds pijn? Ga dan naar uw huisarts.

Tabletten, capsules en drank werken binnen een half uur. De zetpillen werken binnen 1 uur.

Bijwerkingen

Bij normaal gebruik heeft dit medicijn weinig tot geen bijwerkingen.

Gebruikt u paracetamol **meer dan 15 dagen per maand** tegen hoofdpijn? Dit kan juist hoofdpijn veroorzaken. Vraag uw huisarts om advies.

Let op! Als u een **aantal weken meer dan 5 tabletten van 500 mg per dag** gebruikt kan dit schadelijk zijn. U heeft dan een kleine kans op schade aan lever, nieren of bloed.

Waarschuwingen

Let op! Gebruik geen andere medicijnen waar ook paracetamol in zit. U kunt dan te veel binnen krijgen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden. Maar gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft, maar gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

