

Samenvatting van rizatriptan

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Rizatriptan stopt of vermindert een aanval van migraine.
Het werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij migraine.

Dit medicijn werkt na een halfuur tot een uur.

Gebruik

Rizatriptan is er als gewone tabletten en smelttabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gewone tabletten met rizatriptan

Slik de tablet met een half glas water.

Smelttabletten met rizatriptan

Laat de smelttablet op uw tong smelten. Slik het daarna door.

Gebruik dit medicijn bij de eerste hoofdpijnlachten van een migraineaanval.

Helpt de tablet goed maar komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede tablet nemen. Er moet wel **2 uur of meer** tussen de eerste en de tweede tablet zitten.

Let op! Gebruik **niet meer dan 20 mg** rizatriptan in totaal per 24 uur.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- opvliegers
- pijnlijk, beklemmend gevoel in uw borst of keel. Dit gaat meestal binnen 2 uur vanzelf over. Gaat dit niet weg? Waarschuw dan uw arts.
- moe, slaperig of duizelig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Gebruik dit medicijn **niet vaker dan 10 dagen per maand**. U heeft dan juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).



Let op! U mag **4 uur niet rijden** nadat u dit medicijn heeft ingenomen. Rijd daarna alleen als u geen last heeft van bijwerkingen zoals moe, slaperig of duizelig zijn.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

