

# Samenvatting van sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

De sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel is een anticonceptiepil.

Uw arts schrijft de sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel voor om te zorgen dat u niet zwanger wordt.

Verder schrijft uw arts het voor bij:

- menstruatieklasten
- om de menstruatie uit te stellen
- puukels en puistjes (acne)
- endometriose (slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort)

## Gebruik

De sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruikt u de pil om zwangerschap te voorkomen?

- Gebruikt u de pil voor het eerst? Begin dan op de 1e dag van uw menstruatie. U bent dan meteen beschermd tegen zwangerschap.
- **Let op!** Begint u niet op de eerste dag dat u ongesteld bent met de pil, maar een paar dagen later? De pil werkt dan pas ná 7 dagen. Gebruik daarom in de 1e week een extra vorm van anticonceptie. Bijvoorbeeld condooms.
- Gebruikte u vóór deze sub-50-pil eerst een andere pil? Of een andere vorm van anticonceptie? Meestal kunt u meteen overstappen op deze pil. Vraag uw apotheek om uitleg
- **Let op!** Bent u een pil vergeten? Of heeft u binnen 4 uur na het innemen van de pil overgegeven of diarree gekregen? Dan werkt de pil mogelijk niet, of minder goed. U bent dan minder goed beschermd tegen zwangerschap. In de bijsluiter leest u wat u moet doen. Of vraag uw apotheek om advies.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- bloedverlies terwijl u niet ongesteld bent
- buikpijn
- misselijk voelen
- hoofdpijn
- stemmingsveranderingen

Veel bijwerkingen gaan binnen 3 maanden vanzelf weg. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Of blijft u last houden? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** De sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met de sub-50-pil met ethinylestradiol en levonorgestrel.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Bent u zwanger? En heeft u per ongeluk toch de pil ingenomen in de eerste weken van uw zwangerschap? Dit is niet slecht voor uw baby. **Stop met deze pil wanneer u erachter komt dat u zwanger bent.**



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. **Tot 6 weken na de bevalling kunt u de pil beter NIET gebruiken.**

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

