

# Vaccin in het kort voor het **DTP-vaccin**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Dit is een ernstige ontsteking van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Dit kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.
- **Polio.** Dit kan zorgen voor een verlamming van de armen of benen.

De ziektes difterie, tetanus en polio zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van uw kind het virus dat polio veroorzaakt.

Ook herkent het lichaam de bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

Komt uw kind na de vaccinatie in contact met het virus of de bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die uw kind beschermen.

**Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.**

Dit vaccin is een **herhaling**. Uw kind heeft op jongere leeftijd al DKTP-vaccinaties gehad. Na deze vaccinatie is uw kind langer beschermd tegen polio, difterie en tetanus.

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Uw kind krijgt deze vaccinatie **1 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit in het jaar dat uw kind 9 jaar wordt. Uw kind krijgt op hetzelfde moment ook de BMR-vaccinatie.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van **het Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zieker worden.

Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.

Heeft uw kind een **lichte infectie**? Zoals een verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Uw kind is na deze laatste vaccinatie van de serie D(K)TP in het Rijksvaccinatieprogramma minimaal 10 jaar beschermd tegen tetanus.

Heeft uw kind na die tijd een wond die vuil is? Met vuil van de straat of bijvoorbeeld nadat uw kind door een dier is gebeten? Neem dan contact op met uw arts. Uw kind heeft dan misschien een nieuwe vaccinatie nodig.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt uw kind omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van het lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, tetanus en polio.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Koorts, hoofdpijn of duizelig zijn.
- Misselijk zijn of overgeven.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met de jeugdarts of met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).