

# Vaccin in het kort voor het **Pneumokokkenvaccin**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen **10 verschillende soorten pneumokokken**. Dit zijn bacteriën die kunnen zorgen voor een ontsteking. Zoals een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking), een longontsteking of een ontsteking van het middenoor.

Deze ziektes zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam de 10 pneumokokken bacteriën.

Komt uw kind na de vaccinatie in aanraking met deze bacteriën? Dan kan het lichaam snel stoffen aanmaken die deze bacteriën dood maken. **Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.**

## Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Uw kind krijgt deze vaccinatie **3 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit wanneer uw kind 3 maanden, 5 maanden en 12 maanden oud is. Uw kind krijgt op hetzelfde moment ook de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft uw kind een **lichte ontsteking**? Zoals verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Het is belangrijk dat uw kind alle 3 de vaccinaties krijgt. Anders is uw kind niet voldoende beschermd. Uw kind kan dan alsnog ziek worden. Dit is vooral belangrijk voor kinderen jonger dan 5 jaar. Deze kinderen lopen namelijk extra risico op een besmetting met pneumokokken.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen pneumokokken.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen kan last krijgen van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Koorts.
- Minder zin hebben in eten.
- Slaperig zijn.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen kan last krijgen van:

- Huiduitslag, bulten of jeuk.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over het vaccineren van uw kind? Overleg deze dan met de jeugdarts of uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).