

# Samenvatting van valproïnezuur

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Valproïnezuur brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- manie (u heeft veel energie, heeft weinig slaap nodig en bent veel blij). Dit hoort bij de ziekte bipolaire stoornis.
- migraine
- hik die niet overgaat

U merkt pas na een paar weken of het goed bij u werkt. Behalve bij hik, dit moet snel minder worden.

## Gebruik

Valproïnezuur is er als tabletten, korrels, drank, druppels en zetpillen. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injectie. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met valproïnezuur

Slik de tablet heel door met een half glas water. Niet kauwen.

**Let op!** Gebruikt u de tablet met vertraagde afgifte? Ook deze tabletten mag u niet fijnmaken of kauwen. Anders komt de dosis in één keer vrij. U mag deze tabletten wel op de breukstreep breken.

### Druppels met valproïnezuur

1. Meet de juiste hoeveelheid af met het doseerspuitje.
2. Meng dit met een half glas water of limonade en neem dit in.

### Drank met valproïnezuur

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of spuit.
2. Drink die hoeveelheid op.

### Korrels met valproïnezuur

1. Doe de korrels op een lepel met zacht eten. Zoals yoghurt, appelmoes of kwark.
2. Eet dit op.

### Zetpillen met valproïnezuur

Doe de zetpil in de anus (poepgat). Dit mag met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn. U heeft hier minder last van als u dit medicijn met wat eten neemt.
- slaperig zijn
- duizelig zijn
- in de war zijn

In het begin van de behandeling heeft u minder kans op bijwerkingen als u een korte tijd minder medicijn gebruikt. Uw arts vertelt hoe lang dat is.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag in de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen bijwerkingen heeft.



**Let op!** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk komen, maar dit is niet schadelijk voor de baby. U kunt veilig borstvoeding geven. Controleer de baby goed op niet goed willen drinken, overgeven, suf zijn en prikkelbaarheid.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

