

Samenvatting van valsartan

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Valsartan maakt uw bloeddruk lager en zorgt dat uw hart het bloed beter rondpompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij hoge bloeddruk
- bij hartfalen
- na een hartaanval (hartinfarct)

Uw **bloeddruk** daalt langzaam binnen 6 weken. Bij **hartfalen** merkt u dat u minder last heeft van een benauwd gevoel en dikke enkels.

Gebruik

Valsartan is er als tabletten en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met valsartan

Slik de tabletten met een glas water.

Drank met valsartan

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een doseerspuit of doseerbeker.
2. Drink deze hoeveelheid op.

Het is belangrijk dat u dit medicijn **elke dag** inneemt. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Duizelig worden bij het opstaan. Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken. Slik dit medicijn daarom de eerste dagen in de avond als u op bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Valsartan en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met valsartan.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

