

# Samenvatting van valsartan met sacubitril

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Valsartan met sacubitril maakt uw bloeddruk lager en zorgt dat uw hart het bloed beter rondpompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij hartfalen.

Het medicijn gaat binnen 6 weken werken. U merkt dat u minder benauwd bent en dat uw enkels minder dik zijn. Ook bent u minder snel moe

## Gebruik

Valsartan met sacubitril is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies vaste tijdstippen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Slik de tabletten met een half glas water.

Het is belangrijk dat u dit medicijn elke dag inneemt. Dan zal uw hart meer pompkracht behouden.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Duizelig worden bij het opstaan. Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken. Sta daarom langzaam op uit bed of van een stoel. Ga even liggen als u zich duizelig voelt.
- Lusteloosheid en hartritmestoornissen. Dit kan komen door teveel kalium in uw bloed.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Valsartan met sacubitril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met Valsartan met sacubitril.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

