

# Samenvatting van dexamethason in het oog

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Dexamethason is een bijnierschorsormoon (corticosteroid). Het remt ontstekingen. Het maakt roodheid, zwelling, pijn en jeuk van het oog minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij ontstoken ogen.

## Gebruik

Dexamethason in het oog is er als oogdruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

**Let op!** Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u gaat druppelen. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

1. Was uw handen en droog ze af met een schone doek.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje.
5. Laat 1 druppel in het 'gootje' vallen.
6. Sluit uw oog zonder te knijpen.
7. Druk uw traankanaaltje 1 minuut dicht.
8. Sluit het flesje.



Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site.

**Let op!** Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen **1 maand houdbaar**. U kunt op de verpakking schrijven wanneer u het heeft geopend. Oogdruppels voor eenmalig gebruik moet u direct na gebruik weggooien.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van wazig zicht, geïrriteerde of branderige ogen. Dit gebeurt direct na het druppelen en verdwijnt snel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen

Gebruikt u andere medicijnen in uw oog? Wacht minstens 5 minuten tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.



Meer weten over dit medicijn? Scan hier: