

Samenvatting van isosorbidedinitraat voor onder de tong

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Isosorbidedinitraat maakt uw bloedvaten wijder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris).

De pijn verdwijnt binnen enkele minuten

Gebruik

Isosorbidedinitraat is er als tabletten voor onder de tong.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

- Ga zitten als het kan. Dan heeft u minder last van duizeligheid.
- Leg een tablet onder de tong en laat die smelten. De tablet lost op in het speeksel en wordt direct in het bloed opgenomen.
- Verdwijnen de klachten niet? Dan mag u na 5 minuten nog een tablet onder de tong laten smelten.
- Dit mag u als het nodig is na 5 minuten nog eens doen.
- Waarschuw direct een arts als de pijn na 3 keer een tablet en na 15 minuten nog niet is verdwenen. Dit zou kunnen duiden op een hartinfarct.
- Is de tablet nog niet helemaal gesmolten, maar heeft u geen klachten meer? Spuug de rest van de tablet dan uit.
- U kunt ook een aanval van hartkramp voorkomen door de tablet te gebruiken als u verwacht een aanval te krijgen. Gebruik de tablet dan 2 tot 3 minuten voor de te verwachten aanval.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- kloppende of bonzende hoofdpijn
- opvliegers en blozen
- duizelig zijn
- hartkloppingen
- misselijk voelen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Kolf de moedermelk af en gooi deze weg nadat u de tablet heeft ingenomen. Dat is het veiligst.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

