

Samenvatting van ketaconazol tabletten

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ketoconazol onderdrukt de aanmaak van het bijnierschorsormoon cortisol.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de ziekte van Cushing. Dat is een bijnierziekte.

Gebruik

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Neem ketoconazol **tijdens of vlak na het eten**. Dan werkt dit medicijn beter.

Het kan een tijd duren voor de hoeveelheid cortisol lager is.

U gebruikt dit medicijn vaak lange tijd. Soms zelfs levenslang.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- klachten van uw maag en darmen
- huiduitslag
- jeuk

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Dit medicijn kan slecht zijn voor de lever. Daarom zal uw arts uw lever controleren.

Ernstige leverbeschadiging merkt u aan:

- een gevoelige opgezwollen buik
- een gele kleur van huid en oogwit (geelzucht)
- donkere urine
- bleke poep

Heeft u deze bijwerkingen? Stop dan **meteen** met dit medicijn en ga naar uw arts.

Werkt uw lever minder goed? Overleg dan met uw arts

Waarschuwingen



Let op! Ketoconazol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ketoconazol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. U kunt bijvoorbeeld misselijk worden, huiduitslag krijgen of een rood gezicht.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.